

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/barwniak-czerwonobrzuchy-pelvicachromis-pulcher-p-2282.html>



Barwniak czerwono brzuchy - Pelvicachromis pulcher

Cena	16,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Charakterystyka gatunku

Barwniak czerwono brzuchy (Pelvicachromis pulcher) to jedna z najbarwniejszych i najłatwiejszych w utrzymaniu pielęgnic akwariowych. Pochodzi ze stojących i wolno płynących wód Afryki Zachodniej, gdzie zamieszkuje zarośnięte, bogate w kryjówki odcinki dorzecza Nigru. Dzięki swojej odporności, szerokiej tolerancji na parametry oraz łagodnemu usposobieniu stał się jednym z najpopularniejszych gatunków dla początkujących i zaawansowanych akwarystów. Samice zachwycają intensywnie czerwonym brzuchem, a samce eleganckimi, wydłużonymi płetwami — co czyni tę rybę wyjątkowo dekoracyjną.

Barwniak pulcher jest spokojny poza czasem tarła, doskonale odnajduje się w akwariach towarzyskich, a jego łatwe rozmnażanie czyni go wdzięcznym gatunkiem dla osób chcących obserwować zachowania rodzicielskie. W dobrze urządzonym zbiorniku z grotami, korzeniami i roślinnością prezentuje pełnię kolorów i naturalnych zachowań — od spokojnego żerowania, po dynamiczne zaloty.

Rodzina

Pielęgnicowate (Cichlidae).

Występowanie

Afryka Zachodnia – Nigeria i Kamerun, wolno płynące rzeki, dopływy, miejsca z bujną roślinnością i kryjówkami

Wielkość ryby

Samiec 8–10 cm, samica 6–7,5 cm

Minimalne akwarium

Od 70 litrów dla pary; zalecana długość zbiornika min. 80 cm

Parametry wody

Miękka do średnio twardej; woda czysta z licznymi kryjówkami

Temperatura wody: 22-28°C

pH wody: Ok. 5,0-8,0; tolerancja szeroka dzięki wieloletniej hodowli akwariowej

Twardość wody: Do ok. 12-19 dGH

Zachowanie

Spokojny, lekko płochliwy gatunek. W okresie tarła staje się terytorialny. Tworzy pary, opiekuje się potomstwem

Pokarm

Pokarm suchy, mrożony i żywy; dieta mieszana dla lepszego wybarwienia

Z czym można trzymać

Razbory, danio, kiryski, gurami, spokojne gatunki z podobnych środowisk

Rozmnażanie

Łatwe. Tarło odbywa się w kryjówkach; inkubacja 2-3 dni, narybek pływa po ok. tygodniu. Rodzice bronią młodych