

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/bystrzyk-amandy-bystrzyk-karlik-hyphessobrycon-amandae-p-467.html>



Bystrzyk Amandy - Bystrzyk karlik - Hyphessobrycon Amandae

Cena brutto	5,90 zł
Cena netto	5,90 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Bystrzyk Amandy - Bystrzyk karlik - Hyphessobrycon Amandae

Ryba akwariowa Bystrzyk Amandy

Bystrzyk Amandy to bardzo mała jaskrawo ubarwiona czerwono-pomarańczowa ryba akwariowa, dorastająca do nie więcej niż 2 cm. Ze względu na swój kolor i zdolność do trzymania się w stadzie, ryby te nie znikną z pola widzenia nawet w gęsto zarośniętym roślinami akwarium.

Nie ma ścisłych wymagań dotyczących trzymania tych ryb. Najważniejsze jest aby stadko składało się minimum z 6-8 osobników. Dla takiego stada odpowiednie jest akwarium o pojemności 20 litrów lub więcej.

W stosunku do innych gatunków ryba zachowuje się bardziej aktywnie. Do towarzystwa wystarczą wszystkie spokojne małe ryby o podobnych warunkach hodowli. Zgadzą się z innymi tetrami, pielęgniczkami, kirysowatymi i otoskami.

Komfortowa temperatura winna wynosić od 24 do 28 stopni. W biotopach temperatura w zależności od pory roku może wzrosnąć nawet do 30 stopni. Nawiasem mówiąc, w naturze Bystrzyk Amandy zasiedla wolno płynące zbiorniki Brazylii, Peru. Preferuje wodę miękką i lekko kwaśną. Odczyn Ph od 5,5 do 7. Twardość nie większa niż 10, ale im niższa tym lepiej.

W komfortowych warunkach oczekiwana długość życia wynosi do 3 lat. W celu pomyślnej hodowli Amandy zalecamy kontrolowanie parametrów wody w akwarium. Wiele osób zaleca używanie pokrywek w akwariach. Nie bardzo lubią jasne światło, z czasem przyzwyczajają się do niego, ale są bardziej aktywne, gdy oświetlenie jest słumione. Zalecane są cotygodniowe 20% podmiany wody.

W naturze żywią się głównie zooplanktonem i drobnymi bezkręgowcami. Hodowla nie jest bardzo trudna. Trudniej odróżnić samice od samców. Jedyną różnicą jest bardziej zaokrąglony brzuch u u tych pierwszych. Ryby osiągają dojrzałość płciową w wieku 4-6 miesięcy. Na kilka dni przed tarłem samice i samce powinny być obficie karmione. Akwarium tarliskowe powinno być zacienione. W przeciwnym razie ikra zmarnieje. Zapewnij napowietrzanie. Na dnie umieszcza się rośliny drobnolistne lub mech.

Temperaturę podnosi się o kilka stopni. Wprowadza się parę, lub stadko rybek. W stadzie powinno być więcej samców. Lepiej zrobić to wieczorem. Aby ikra nie została zjedzona, tarlaki umieszcza się rano. W zależności od temperatury wody inkubacja trwa od 22 do 36 godzin.