
Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 01:19

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/danio-teczowy-brachydanio-albolineata-p-692.html



Danio Tęczowy - Brachydanio albolineata

Cena	**6,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Danio Tęczowy - Brachydanio albolineata

Ryba akwariowa Danio Tęczowy

Rodzina: Cyprinidae

Występowanie: Danio albolineatus są szeroko rozpowszechnione w Birmie, Tajlandii, Laosie, Kambodży, Wietnamie, na Półwyspie Malajskim i na Sumatrze.

Siedlisko:

Danio albolineatus zamieszkuje zarówno bogate w tlen, czyste, kamieniste strumienie przepływające przez obszary leśne, jak i zbiorniki stojące, takie jak stawy i pola ryżowe.

Maksymalna standardowa długość: 5,0 – 5,5 cm

Zalecana wielkość akwarium: 100 litrów

Warunki lęgowe: Danio albolineatus bardzo efektownie prezentuje się w gęsto obsadzonym akwarium z ciemnym podłożem. W pustym akwarium wygląda jaśniej.

Dodaj kawałki drewna, korzenie, a także rośliny, takie jak Microsorum, Bolbitis lub Anubias, które również mogą rosnąć przyczepione do korzenia lub kamienia.
Akwarium powinno mieć szczelną pokrywę, ponieważ ryby mogą wyskakiwać.

Parametry wody: temperatura 18 – 25 °C, pH 6,0 – 8,0, twardość 18 = 357 ppm

Pokarm: W naturze Danio tęczowe żywi się owadami i ich larwami. W akwarium akceptuje każdą suchą karmę, ale preferuje pokarmy mrożone i żywe, takie jak dafnia i artemia.

Zachowanie i kompatybilność:

Danio albolineatus jest gatunkiem bardzo spokojnym i może być trzymany razem

z małymi karpiowatymi, tetrami, żyworódkami , tęczankowatymi, sumami i bocjami.

Jeśli chcesz akwarium biotopowe, możesz je trzymać z rybami z Mekongu, takimi jak Acanthocobitis, Annamia, Balitora, Homaloptera, Nemacheilus, Schistura, Sewellia, Lepidocephalichthys, Pangio, Yasuhikotakia, Crossocheilus, Devario, Garra, Rasbora, Glossogobius, Rhinogobius , Glyptothorax, Akysis i Trichogaster.

Danio tęczowy jest gatunkiem stadnym i należy trzymać w nim co najmniej 8-10 ryb.

Dymorfizm płciowy: Dojrzałe samice są bardziej okrągłe od samców, nieco bledsze

i większe. Różnicę najlepiej widać w okresie lęgowym, kiedy samce są bogato ubarwione, a samice pełne ikry.

Rozród: Danio albolineatus osiąga dojrzałość płciową w wieku 6 miesięcy.

Jeśli ryby czują się dobrze i są w akwarium gęsto obsadzonym roślinami, możliwe, że małe rybki pojawią się nawet bez interwencji człowieka.

Pokarm: są wszystkożerne