

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/ksiezniczka-z-burundi-neolamprologus-brichardi-p-543.html>



Księżniczka z Burundi - Neolamprologus brichardi

Cena brutto	13,00 zł
Cena netto	13,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Księżniczka z Burundi - Neolamprologus brichardi

Ryba akwariowa Księżniczka z Burundi - Neolamprologus brichardi

Pierwsze okazy Neolamprologus brichardi (Brichard, 1989) zostały po raz pierwszy sprowadzone do Europy w 1971 roku, złowione w pobliżu miejsca zwanego Magara w Burundi. Te pełne wdzięku pielęgnice natychmiast otrzymały nazwę handlową „Princess Burundi”. Ich ubarwienie nie było zbyt jaskrawe, ale ryby wyróżniały się płetwami i eleganckim ciałem, które sprawiły, że Księżniczka stała się jedną z najpopularniejszych pielęgnic wśród akwarystów.

Okazało się, że nowe ryby świetnie czują się w akwariach, nawet pomimo ich skłonności do terytorializmu i względnej agresywności z tym związanej. Biorąc pod uwagę wystarczająco dużo miejsca dla ryb, akwarystom zaskakująco łatwo było wychować potomstwo. To najbardziej fascynujący aspekt utrzymania tego gatunku, ponieważ starsze pokolenia aktywnie pomagają rodzicom w ochronie młodych. W ten sam sposób gatunek ten zachowuje się w swoim naturalnym środowisku, tworząc ogromne stada osobników w różnym wieku.

Powierzchnia: jezioro Tanganika

Wymiary: 9 cm, w akwarium 7-12 cm.

Różnice płci: Samce są większe niż samice, z dłuższymi płetwami.

Czy Księżniczka z Burundi jest łagodna? agresywność przejawia się tylko w okresie tarła.

Zbiornik: Akwarium - od 30-50 litrów na parę lub co najmniej 150 litrów na grupę ryb. Dobrze jest rośliny zabezpieczyć tak, aby ryby ich nie wykopały, należy sadzić w doniczkach lub obudować kamieniami lub korzeniami. Twardość wody: 8-25°,

pH 7,3-8,6, temperatura 22-27°C. Wymagane jest napowietrzanie, filtracja i podmiany wody (10-30% objętości tygodniowo). Szkło nakrywkowe jest koniecznością.

Karmienie: ryby mięsożerne.

Hodowla: osiągają dojrzałość płciową w wieku 8-10 miesięcy. Tarło pary lub grupa ryb. Temperatura 26-28°C. Ikra jest składana od wewnątrz kryjówek. Ryby składają od 50-200 jaj. Okres inkubacji trwa około 3 dni, po kolejnych 6-8 dniach. narybek zaczyna pływać i rozglądać się za pożywieniem.

Pokarm podstawowy: wrotki, artemia i cyklop. Rodzice długo chronią potomstwo, a narybek kilku pokoleń często można zaobserwować w jednym akwarium.