

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/pstrazenica-marmurkowa-carnegiella-strigata-p-461.html>



Pstrążeńica marmurkowa-Carnegiella strigata

Cena	16,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pstrążeńica marmurkowa-Carnegiella strigata

Występowanie: Najczęściej w naturze **pstrążenicę marmurkową** można znaleźć w strumieniach lasów północno-wschodniej Brazylii i Gujany.

Różnice w wyglądzie i płci: Wysoki korpus mocno spłaszczony z boków, profil brzucha i klatki piersiowej wypukły, profil linii grzbietowej prosty. Płetwa grzbietowa jest przesunięta do tyłu ciała. Płetwy są bezbarwne. Grzbiet ryby jest oliwkowy, boki srebrzyste z niebieskawymi, żółtawymi lub zielonkawymi odcieniami. Żółty pasek biegnie od pokrywy skrzelowej wzdłuż całego ciała do płetwy ogonowej, a poniżej przylegają do niego trzy ukośne czarne paski. Na brzuchu znajduje się cienka plamka. Patrząc z góry lub z przodu, samica wygląda na pełniejszą, samiec jest mniejszy. Długość ryby nie przekracza 4,5 cm.

Warunki hodowli:

Spokojne stadne ryby, potrafią wyskakiwać z wody i lecieć nawet 3-4 m, a także ślizgać się po samej powierzchni wody. Najczęściej zajmują górne warstwy wody. Zalecane trzymanie (8-10 osobników) w akwarium, którego długość powinna wynosić minimum 1 m. Dobrze odnajdują się się ze skalarami, paletkami, żyworódkami, rasborą, danio przegowanym zbrojnikami.

W akwarium wymagany wyraźny prąd wody, który ma m.in. zadanie natleniania. W zbyt spokojnej wodzie pstrążeńica przybiera na wadze i umiera. Dla komfortu ryb na powierzchni wody powinny znajdować się rośliny pływające, które tworzą cień. Ponieważ te ryby skaczą, akwarium musi być zamknięte od góry. Aby ryby skakały bez uderzania w pokrywę, napełnij akwarium wodą w 2/3 objętości. Według niektórych źródeł zalecana jest woda filtrowana przez torf.

Optymalne parametry wody do utrzymania pstrążenicy: temperatura 24-26°C, pH 6-7,5, dH nie wyższe niż 15°. Wymagane napowietrzanie i filtracja, cotygodniowa wymiana 20-25% wody w akwarium.

Ryby te żywią się małymi owadami oraz suchą karmą, która jest łatwiej pobierana z powierzchni wody, ale praktycznie nie jest zbierana z dna. Żywa karma powinna przeważać w diecie, w przeciwnym razie średnia długość życia ryb ulega znacznemu skróceniu. W sprzyjających warunkach oczekiwana długość życia tych ryb sięga 7-8 lat.

Rozmnażanie

Dojrzałość płciową osiągają w wieku 1-1,5 roku. Tarło odbywa się w osobnym akwarium (o długości ponad 1 m) z pływającymi lub posadzonymi drobnolistnymi roślinami akwariowymi. Pomiędzy powierzchnią wody a szybą zakrywającą akwarium musi być zachowana odległość co najmniej 25 cm. Oświetlenie rozproszone, słabe. Woda w akwarium miękka, cieplejsza i kwaśna (dH do 5 °,

Temp: 25-28 ° C, pH 5,5...6,5). Wysokość słupa wody od 15 do 20 cm, ruch wody w górnych warstwach zapewnia pompa. Na tarło umieszczana jest grupa ryb, w której przeważają samice. Tarło odbywa się blisko powierzchni pod drobnolistnymi lub pływającymi roślinami w nocy lub wczesnym rankiem. Część jaj osadza się na liściach roślin, ale większość opada na dno. Pod koniec tarła ryby powinny się zabrać ze zbiornika tarliskowego. Po 24-40 godzinach wykluwają się małe larwy, po kolejnych 72-120 godzinach zaczynają przyklejać się do powierzchni wody. W pierwszym dniu życia narybek zalecane jest słabe oświetlenie. Narybek karmiony jest orzeskami, wrotkami, miążdżonymi w pył suchymi naupliusami solowca. Narybek jest bardzo płochliwy i potrafi wyskoczyć z akwarium.