

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/razbora-kalochroma-razbora-wielkoplama-rasbora-kalochroma-p-748.html>



Razbora Kalochroma - Razbora Wielkoplama - Rasbora Kalochroma

Cena	11,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Razbora Kalochroma - Razbora Piękнопłetwa - Rasbora Kalochroma

Stadna ryba akwariowa Razbora Kalochroma zwana Piękнопłetwą lub Wielkoplamą

Rodzina karpiowatych (Cyprinidae).

Razbory te żyją w leśnych strumieniach, jeziorach, rzekach i stawach na Półwyspie Malakka, na wyspach Kalimantan i Sumatra.

Razbora Kalochroma ma smukłe i wydłużone ciało. Płetwa ogonowa jest dwupłatkowa. Grzbiet jest brązowoczerwony z zielonkawym odcieniem, brzuch jest różowawy do żółtawo-białego. Od pokrywy skrzelowej do nasady płetwy ogonowej biegnie błyszczący jasnozielony pasek. Z boku, z przodu i z tyłu ciała znajdują się czarne plamy, które czasami łączy niewyraźny ciemny pasek (często w postaci kropek). Płetwy są krwistoczerwone, końcówka płetwy odbytowej jest czarna. Różnice płciowe: samica jest pulchniejsza od samca, jej płetwa odbytowa jest jaśniejsza. **Rasbora Piękнопłetwa** dorasta do 5 cm długości.

Razbora Kalochroma to aktywna, spokojna ryba pływająca w środkowej warstwie wody. Konieczne jest trzymanie jej w dużej ławicy, w przeciwnym razie ryby nie czują się zbyt dobrze, stają się wolniejsze, a kolor zanika. Ryba nadaje się do akwarium towarzyskiego o pojemności najlepiej 200 litrów z zaroślami i wolną przestrzenią do pływania.

Optymalne parametry wody: twardość 4-12°, pH 6,0-7,2, temperatura 23-25°C. Wymagana jest filtracja, napowietrzanie i cotygodniowe podmiany do 25% objętości wody.

Razbory Kalochromy jedzą dowolny pokarm: żywy, suchy.

Do hodowli rasbory potrzebne jest akwarium z pokrywą. Aby przygotować ryby do tarła, należy je przetrzymywać od listopada do marca w temperaturze 22-23°C przy krótkim świetle dziennym (około 10 godzin), a następnie oddzielić samice od samców przez 1-2 tygodnie i zwiększyć temperaturę tarła; u samic do 26-28°C, a u samców o 1-1,5°C niżej. Parametry wody do hodowli: twardość 1,5-3°, pH 5,5-6,5, temperatura 25-28°C, poziom wody 15-20 cm. Ryby przesadza się wieczorem na tarło. Samica składa ikrę rano, po czym usuwa się tarlaki, obniża poziom wody do 10 cm i przyciemnia akwarium. Okres inkubacji trwa 24-36 godzin. Narybek zaczyna pływać i żerować po 3-5 dniach. Pokarm startowy: żywy pył (orzeski, wrotki).