Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:28

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/sum-drewniak-bunocephalus-coracoideus-p-438.html



# Sum drewniak-Bunocephalus coracoideus

| | |
|---|---|
| Cena | **25,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

**Sum Drewniak-Bunocephalus coracoideus**

Drewniak - Ryba o nietypowym wyglądzie.

Środowisko naturalne: dorzecze Amazonki
Wielkość: Bunocephalus dorasta do 15 cm długości.

Ryby prowadzą nocny tryb życia, dlatego aby je obserwować, należy zainstalować dodatkowe nocne oświetlenie. Ma spłaszczone ciało, które płynnie przechodzi w płetwę ogonową w formie stożka. Kolor ryby odpowiada jej nazwie sum - driftwood, jest to ciemna plama na ciele i bardzo przypomina kawałek drewna typu driftwood.

W przeciwieństwie do samców samice są znacznie pełniejsze. Ryby są bardzo spokojne i muszą być trzymane z rybami spokojnymi.

W akwarium z Bunocephalusem powinno być wiele kryjówek, na przykład z roślin, małych jaskiń w postaci kamieni itp. Należy zauważyć, że w akwarium bez schronień sum, chowając się, zakopuje się bezpośrednio w ziemi. W rzeczywistości ten rodzaj ryb ma wyjątkową zdolność do kamuflażu i czasami bardzo trudno jest go znaleźć w swoim akwarium. Wskazane jest, aby jako podłoże używać ciemnego żwiru.

Woda w akwarium z Drewniakiem powinna mieć temperaturę w zakresie 21-26°C, twardość do 15-20°C i kwasowość 6,0-7,0. Konieczna jest dobra filtracja i napowietrzanie wody, a także cotygodniowa jej wymiana co najmniej 1/3 objętości całej wody w akwarium.

Bunocephalusy jedzą każdą tonącą, mrożoną i suchą mieszaną karmę mięsną jako priorytet. Ze względu na to, że ryby te wykazują aktywność tylko w nocy, należy je karmić późnym popołudniem. Należy również pamiętać, że sumy mają skłonność do przejadania się i bardzo łatwo je przekarmić. Aby tego uniknąć, karma musi być ściśle dozowana.

**Hodowla**

Ryby osiągają dojrzałość płciową w wieku 12 miesięcy.

Jak w przypadku wszystkich sumów, tarło odbywa się w nocy. Bodźcem do rozpoczęcia tarła jest wprowadzenie iniekcji preparatu hormonalnego, a także wymiana co najmniej 80% świeżej wody w akwarium. W akwarium konieczne jest wytworzenie prądu, kierującego wylot filtra wzdłuż akwarium. Podczas tarła, będąc w strumieniu wody, ryby wydają się latać, czepiając się siebie.

Ikra jest bardzo lepka i ma kolor zielonkawy. W trakcie tarła ikra niesiona jest z prądem wody przez całe akwarium, gdzie przyczepia się do wszelkiego rodzaju przedmiotów. Sumy te nie jedzą swojej ikry, więc nie ma potrzeby jej przed nimi chronić.

Podczas tarła jedna samica składa do 300 jaj. W temperaturze 26 ° C jaja są inkubowane przez 2 dni. Około dwa dni później pojawia się narybek, który podobnie jak jego rodzice zaczyna prowadzić skryty tryb życia i chować się w każdym zakamarku, jaki napotka na swej drodze.

Jedna samica składa od 200 do 300 jaj. Jaja dojrzewają w ciągu 35-48 godzin, następnie pojawiają się larwy. Po około dwóch dniach pojawiające

się młode rybki chowają się we wszelkich szczelinach. Rybki wybarwiają się w 4-5 dniu.

Narybek karmiony jest wrotkami, cyklopem i innym drobnym pokarmem.

Najtrudniejsze dla akwarysty są pierwsze miesiące życia narybku. Należy skupić się na jakości wody.