Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:30

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/ukosnik-ozdobny-nannostomus-eques-p-747.html



Ukośnik ozdobny - Nannostomus eques

Cena	**12,90 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Ukośnik ozdobny - Nannostomus eques

Stadna ryba akwariowa Ukośnik ozdobny

Występowanie: Dorzecze środkowego biegu Amazonki i Rio Negro. Zamieszkuje dopływy, podmokłe strumyki porośnięte roślinnością wodną. Występuje na obszarach zalewowych lasów i jezior w obszarach czarnowodnych.

Max długość ryb: do 5cm

Nannostomus eques został sprowadzony do Europy w 1910 roku. Ryby te różnią się od większości innych ryb tym, że trzymają się ukośnie, głową do góry.

Wygląd i kolorystyka Ukośników

Brzuch jest ciemny ze złotym paskiem na środku ciała, a grzbiet w kolorze oliwkowym, który jest usiany ciemnymi plamami. Płetwa ogonowa jest mocno podzielona na bezbarwny płat górny i ciemniejszy płat dolny, otoczony czerwonym paskiem.

Ciemna płetwa odbytowa ozdobiona jest rubinowoczerwoną „latarnią" i otoczona od dołu białym paskiem. Płetwa tłuszczowa jest nieobecna. Płetwy grzbietowa i piersiowa są przezroczyste. Płetwy brzuszne samicy są również przezroczyste, natomiast u samców mają opalizującą obwódkę.

Warunki hodowli Ukośnika ozdobnego są podobne jak w przypadku innych gatunków Nannostomus. Gęsto obsadzone akwarium z ciemnym podłożem, obszary roślinności pływającej, wokół których gromadzą się ryby w oczekiwaniu na żer. Do oczyszczania wody wystarczy gąbka napędzana powietrzem.

Optymalne parametry: temperatura wody 22-28°C, pH 4,5-7,5, twardość 18-179 ppm.

Karmienie ryb

W żerowaniu drapieżników jest pewna specyfika: w naturalnych warunkach biotopowych Ukośniki żerują przy powierzchni wody spadającymi owadami, co wiąże się z nachyloną pozycją ciała, dlatego ryby niechętnie pobierają pokarm z dna i wolą chwytać pływające na wodzie lub w słupie wody. Są wszystkożerne.

Kompatybilność Nannostomus eques

Do gatunków sympatrycznych zalicza się Dicrossus gladicauda, Hemigrammus bleheri, Hyphessobrycon stictus, Copella meinkeni, Apistogramma uapesi, a głębiej – Mesonauta insignis i Biotodoma wavrini.