

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/ziemiojad-red-head-tapajos-geophagus-p-2279.html>



Ziemiojad Red Head Tapajos – Geophagus sp. Red head Tapajos

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Występowanie i biotop

Gatunek występuje w Ameryce Południowej, w Brazylii – w dorzeczu rzeki Tapajós, należącej do systemu Amazonki. Naturalnym środowiskiem są tzw. „czarne wody” – miękkie, lekko kwaśne i dobrze natlenione.

Wygląd i wielkość

- Maksymalna długość w naturze: do 25 cm
- W akwarium: najczęściej 15–17 cm (ok. 2 lat)
- Ciało wydłużone, bocznie spłaszczone
- Ubarwienie: od srebrzystego do złocisto-oliwkowego
- Czerwona głowa i czoło
- Turkusowe obrzeża łusek
- Niebieskie wargi i czerwono-złota tęcza
- Ciemna, okrągła plama na środku ciała
- Płetwy grzbietowa, odbytowa i brzuszna w czerwono-niebieskie pasy

Samce są większe, intensywniej wybarwione i posiadają bardziej wydłużone promienie płetw.

Zachowanie i wymagania akwarium

Ziemiojady to ryby stadne – najlepiej czują się w grupie 6–12 osobników. Charakterystyczne dla nich jest przesiewanie piasku w poszukiwaniu pokarmu, dlatego podłoże powinno być drobne i piaszczyste.

Rekomendowana pojemność akwarium:

- Minimum 250 l
- Optymalnie 350 l dla większej grupy

Dobrze funkcjonują w zbiornikach towarzyskich z innymi spokojnymi pielęgnicami amerykańskimi (np. Uaru, Severum). Wymagają dobrej filtracji, napowietrzania i regularnych podmian wody (20–30% tygodniowo).

Ziemiojad parametry wody

W akwarium:

- Temperatura: 26–30°C (optymalnie 27,5–28°C)
- pH: 6,5–7,5
- Twardość: 5–24°dGH

Do rozmnażania:

- Temperatura: 28–32°C
- Twardość: 6–10°dGH

Żywienie

W naturze są mikrodrapieżnikami – żywią się drobnymi bezkręgowcami z podłoża. W akwarium chętnie przyjmują:

- pokarm żywy
- pokarm mrożony
- drobny granulat i płatki
- dodatki roślinne

Geophagus rozmnażanie

Ziemiojad Read head Tapajos oraz pozostałe odmiany osiągają dojrzałość płciową w wieku około roku (10–12 cm). Tworzą trwałe pary w grupie. Tarło odbywa się na podłożu, po czym rodzice inkubują ikry w pysku przez 11–14 dni. Opieka nad potomstwem jest silnie rozwinięta.

Pierwsze tarło: 150–200 jaj

Kolejne: 300–400 jaj

To gatunek polecany średniozaawansowanym i zaawansowanym akwarystom, którzy dysponują większym zbiornikiem i chcą stworzyć naturalny, południowoamerykański biotop.